


Durée de conservation des sirops après ouverture ?



Sirops :

En règle général : 1 mois à température ambiante

Si pas spécifié dans la notice : 1 mois

Suspensions reconstituées : (exemple les antibiotiques)

7 à 15 jours à +2°C +8°C

Tableau récapitulatif

Sirops / Suspensions buvables	Délai de conservation après ouverture	Conditions de conservation	Laboratoires
Advil	6 semaines* <small>*bien laver la pipette eau/alcool blanc après chaque dose</small>	T°max +2°C à +8°C (bas du frigo)	Wyeth
Aerius	6 mois	Moins de 30°C	Schering-Plough
Antarelle sus.buv	6 mois	T°ambiante	Elerté
Augmentin (100, 125 mg) Enfants et Nourrissons	7 jours (reconstitution)	T°max +2°C à +8°C	GSK
Bristopen	15 jours	+2°C à +8°C	BMS
Céléstène	2 mois	T°ambiante	Schering-Plough
Clamoxyl (125/5ml, 250/5ml, 500/5ml)	7 jours (reconstitution)	Moins de 25°C	GSK
Clarytine	3 mois	T°ambiante	Schering-Plough
Codenfan	1 mois	T°ambiante	Bouchara-Recordati
Dépakine	1 mois	T°ambiante	Sanofi-Aventis
Dextrocidine	études en cours	études en cours	Thérabel

Tableau récapitulatif

Sirops / Suspensions buvables	Délai de conservation après ouverture	Conditions de conservation	Laboratoires
Doliprane	1 mois	T°ambiante	Sanofi-Aventis
Efferalgan Pédiatrique	6 mois	T°ambiante	BMS
Ergix	1 mois	T°ambiante	Merck santé familiale
Fungzone	10 jours <small>(étude interne à BMS pas encore reconnu dans l'AMM)</small>	T°ambiante	BMS
Haldol susp.buv	3 mois	T°ambiante	Janssen-Cilag
Hellicidine	6 mois	T°ambiante	Thérabel
Immodium	1 mois	T°ambiante	Janssen-Cilag
Medibronc	1 mois	T°ambiante	Merck santé familiale
Motilium	3 mois	T°ambiante	Janssen-Cilag
Mycostatine	7 jours	T°<25°C	BMS
Norset	6 semaines	Moins de 25°C	Organon
Oracéfal	7 jours	T°<25°C	BMS
Pneumorel	15 jours	T°ambiante	Servier
Polaramine	3 mois	Moins de 25°C	Schering-Plough

Tableau récapitulatif

Sirops / suspensions buvables	Délai de conservation après ouverture	Conditions de conservation	Laboratoires
Prepulsid	1 mois	T°ambiante	Janssen-Cilag
Prospan sans sucre	1 mois	T°ambiante	Médiflore (Merck santé familiale)
Reminyl	3 mois	T°ambiante	Janssen-Cilag
Risperdal	3 mois	Moins de 30°C	Janssen-Cilag
sirop Peter's	1 mois	T°ambiante	Merck santé familiale
Sustiva	1 mois	Pas de précision	BMS
Telzir 50mg/ml	28 jours	T°ambiante	GSK
Terpine Gaunon	1 mois	T°ambiante	Merck santé familiale
Tinset sus.buv	1 mois	T°ambiante	Janssen-Cilag
Toplexil	6 mois	T°ambiante	Sanofi-Aventis
Toprec	2 mois	T°ambiante	Grünenthal
Tussidane	1 mois	T°ambiante	Elerté
Vfend	14 jours (reconstitution)	T°max +2°C à +8°C	Pfizer
Zerit	30 jours (reconstitution)	+2°C à +8°C	BMS
Ziagen sus.buv	2 mois	Moins de 30°C	GSK
Zithromax	5 jours (reconstitution)	Moins de 25°C	Pfizer
Zovirax susp.buv (200mg/5ml, 800mg/120ml)	3 ans	T°ambiante	GSK

Conseils aux patients

- ✓ noter la date d'ouverture des sirops ou suspensions buvables
- ✓ bien conserver les flacons dans leur emballage qui les protégera de la lumière
- ✓ endroit sec et frais